


Solucionario

Introducción al Álgebra

1. Considere $a \Delta b$, como la instrucción: "el primer número elévelo al segundo y a continuación súmelo el segundo."
Resolviendo $(2 \Delta 5)$ se tiene: $2^5 + 5 = 32 + 5 = 37$
Considere $a \# b$, como la instrucción: "multiplique el primer número por 2 y a continuación, réstele el segundo."
Luego. $(37) \# (-2) = 2 \cdot 37 - 4(-2) = 74 + 8 = 82$

2. $5t - \{-[-t^2 + 2 + 3] - t^2 + 8t\}$
 $5t - \{t^2 - 5 - t^2 + 8t\}$
 $5t + 5 - 8t \Rightarrow -3t + 5 = \boxed{5 - 3t}$



3. $\left(-\frac{21}{16} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{6}\right) (m^3 \cdot m^{-5} \cdot m) (n^2 \cdot n^{-1} \cdot n)$
 $\underbrace{\quad}_{-\frac{1}{8}} \cdot \underbrace{\quad}_{m^{-1}} \cdot \underbrace{\quad}_{n^2}$



4. Observando la secuencia se determina que el 5º, 6º y 7º término son respectivamente $10(k+15)$, $12(k-18)$ y $14(k+21)$
sumando el 6º y 7º término se tiene:

$$(12k - 12 \cdot 18) + (14k + 14 \cdot 21) = 26k - 216 + 294 \\ = 26k + 78$$

5. $\underbrace{(4m+3)}_{\text{base}} \cdot \underbrace{(4m-3)}_{\text{altura}}$




$$\begin{aligned}
 6. \quad (-b+3)^2 &= (3-b)^2 \\
 &= 9 - 6b + b^2 \\
 &= -6b + b^2 + 9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad -(36 - 12\sqrt{6} + 6) &= -(42 - 12\sqrt{6}) \\
 &= \text{como } \sqrt{4} < \sqrt{6} < \sqrt{9} \\
 &\quad 2 < \sqrt{6} < 3 \\
 &\text{entonces } 42 > 12\sqrt{6} \\
 &\text{por lo tanto } -(42 - 12\sqrt{6}) \text{ es un irracional negativo}
 \end{aligned}$$

$$8. \quad b^2 + 2b + 1 - 5b - 10$$

$$\boxed{b^2 - 3b - 9}$$



9. $(1 + \sqrt{5}) \cdot (1 - \sqrt{5})$ [suma por diferencia]

$$1^2 - \sqrt{5}^2$$

$$1 - 5 = \boxed{-4}$$

10. $(x + 4)(x - 4)(x + 2)(x - 2) =$

$$(x^2 - 16)(x^2 - 4) =$$


$$x^4 - 4x^2 - 16x^2 + 64 =$$

$$x^4 - 20x^2 + 64$$

11. $u^4 - v^4 = (u^2 + v^2)(u^2 - v^2) =$

$$t^{2x} \cdot t^{2y} =$$

$$t^{2x+2y}$$



12.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & | & & | & & | & & | \\
 & 2a-7 & & 2a-5 & & 2a-3 & & 2a-1 \\
 & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \\
 & 2a-7 & + & 2a-5 & + & 2a-3 & = & \boxed{6a-15}
 \end{array}$$

13.

$$x+1 - 2\sqrt{x+1} \cdot \sqrt{x-1} + x-1$$


$$2x - 2\sqrt{(x+1)(x-1)}$$

$$\boxed{2x - 2\sqrt{x^2-1}}$$

14. Por simple inspección de las alternativas:

$$(2x+7)(2x+1) = 4x^2 + 16x + 7$$

$$\begin{array}{|c|}
 \hline \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 2x+7 \\
 2x+1
 \end{array}$$




15. $5a^2 + 3a - 2 = 5a^2 + 5ay + ax + xy$ Se igualan los coeficientes.
 $5a^2 + 3a - 2 = 5a^2 + (5y+x)a + xy$ Entonces
 $\xrightarrow{5y+x=3} \xrightarrow{xy=-2} \boxed{x=-2 ; y=1}$

16. Diferencia de Cubos
 $a^3 - b^3 = (a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$
 Entonces:

$$\boxed{64K^3 - 1 = (4K-1)(16K^2 + 4K + 1)}$$


17. $6b^2 + 13b + 6 = (3b+2)(2b+3)$,
 luego son factores: $(3b+2)$, $(2b+3)$ y 1



18. Área del cuadrado = $4(x^2 + 2x + 1)$
 $= 4(x+1)^2$

Lado del cuadrado = $\sqrt{4(x+1)^2}$
 $= 2(x+1)$

Como la figura tiene 5 lados iguales, entonces el perímetro es $P = 5 \cdot 2(x+1) = 10(x+1)$




19. Como $(X \diamond Y) = X - 2Y$ y $(X \Delta Y) = X + 2Y$, entonces

$$\begin{aligned} (X \diamond Y)(X \Delta Y) - (X \diamond Y)^2 &= (X - 2Y)(X + 2Y) - (X - 2Y)^2 \\ &= X^2 - 4Y^2 - (X^2 - 4XY + 4Y^2) \\ &= X^2 - 4Y^2 - X^2 + 4XY - 4Y^2 \\ &= 4XY - 8Y^2 \end{aligned}$$

20. I) Verdadera, ya que $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$

II) Falsa, porque el cuadrado de $x-3$ es $x^2 - 6x + 9$.

III) Verdadera, ya que $(x+4)(x+3) = x^2 + 7x + 12$



21. se factoriza por $p+q$

$$(p+q) \cdot [1 + (p+q)] \text{ o bien}$$

$$(p+q) \cdot (p+q+1)$$

22. $(x^2)^2 - 13x^2 + 36 = (x^2 - 9)(x^2 - 4)$

$$= (x+3) \cdot (x-3) \cdot (x+2) \cdot (x-2)$$

o bien:

$$(x-3)(x+3) \cdot (x-2)(x+2)$$


23. Si $x^2 =$ cuadrado del 1º término y $= \frac{5}{3}x =$ doble producto

entonces $u^2 =$ cuadrado del 2º término

$$\text{Así: } x^2 + \frac{5}{3}x + u^2 = (x+u)^2$$

$$\frac{5}{3}x = 2xu \Rightarrow u = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow u^2 = \frac{25}{36}$$




24.

$$\begin{aligned}
 25^{n-1} &= (5^2)^{n-1} = 5^{2n-2} \\
 &= 5^{2n-3} - 5^{2n-4} + 5^{2n-5} \quad (\text{se factoriza por la potencia de menor exponente}) \\
 &= 5^{2n-3}(1 - 5^2 + 5^4) \\
 &= 5^{2n-3}(-19) \text{ o bien } \boxed{-19 \cdot 5^{2n-3}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 25. \quad (a^2 + 6ab + b^2) &= a^2 + 2ab + b^2 + 4ab = (a+b)^2 + 4ab \\
 &= 8^2 + 4 \cdot 10 \\
 &= 64 + 40 = 104
 \end{aligned}$$

26. Supongamos $a=1$; $b=2$; entonces:

$$\left. \begin{aligned}
 P &= 1^2 + 2^2 \Rightarrow P = 5 \\
 Q &= (1+2)^2 \Rightarrow Q = 9 \\
 R &= \frac{1^3 + 2^3}{1+2} \Rightarrow R = 3
 \end{aligned} \right\} \boxed{R < P < Q}$$



27. (1) Insuficiente:

$$x^2 - y^2 = \underbrace{(x+y)}_{\text{desconocido}} \underbrace{(x-y)}_{\text{conocido}}$$

(2) Suficiente:

$$\begin{aligned} x^2 - y^2 &= (x+y)(x-y) ; \text{ si } x=y \\ &= (x+y)(x-x) = 0 \end{aligned}$$


28.

$$\underbrace{ax - by - ay + bx}_{ax+bx - ay-by}$$

$$(a+b)x - (a+b)y = \boxed{(a+b)(x-y)}$$


(1) Insuficiente: $(a+b)$ conocido, pero $(x-y)$ desconocido.

(2) Suficiente: $(a+b) \cdot (x-y)$; si $x=y$
 $\Rightarrow (a+b) \cdot (x-x) = 0$



29. (1) suficiente: si $3a = 5b$ entonces:
 $3a - 3a - 3 = -3$.
- (2) Insuficiente: se conoce a , pero
no b .
- $$\Rightarrow 3 \cdot (-3) - 5b - 3 = -12 - 5b$$

30. (1) Insuficiente:
si $x^2 = 81$, entonces $x = 9$ ó $x = -9$
y se necesita que x sea positivo. ($x > 0$)
- (2) Insuficiente:
se necesita que x sea estrictamente
positivo. ($x > 0$)
- (1) + (2) Insuficiente
- $$x^2 = 81 \Rightarrow x = 9 \text{ ó } x = -9; \text{ cumple con}$$
- (1) y con (2), pero no verifica $x > 0$.




Solucionario

Fracciones Algebraicas

1.
$$\frac{-7}{21} \cdot \frac{a^3}{a^{-5}} \cdot \frac{b^{-2}}{b^3} = -\frac{a^8}{3b^5}$$

2.
$$\frac{10b}{5p} - \frac{15b^2}{5b} = 2 - 3b$$

3.
$$\frac{12p - 12q}{3p - 3q} = \frac{4(3p - 3q)}{3p - 3q} = 4$$




$$4. \frac{(x+9)(x-2)}{(x+9)(x-7)} = \frac{x-2}{x-7}$$

5. Factorizando: $5t^2 + 3t - 2 \cdot \frac{5}{5}$

$$\frac{(5t)^2 + 3(5t) - 10}{5} = \frac{(5t+5)(5t-2)}{5 \cdot (2-5t)}$$

$\frac{5t-2}{2-5t} = -1$

$$= \frac{(5t+5) \cdot (-1)}{5} = \frac{5(t+1) \cdot -1}{5} = -t-1 //$$



$$6. \quad \frac{a^2 - a - 12}{16 - a^2} = \frac{\overset{-1}{\cancel{a-4}}(a+3)}{\cancel{(4-a)}(4+a)} = \frac{-1 \cdot (a+3)}{4+a} = \frac{-a-3}{4+a} //$$


$$16 - a^2 = 4^2 - a^2 = (4+a)(4-a)$$

$$\frac{a-4}{4-a} = -1$$

$$7. \quad \frac{x+8}{x-7} : \frac{6}{3x-21} = \frac{x+8}{x-7} \cdot \frac{3x-21}{6}$$

$$= \frac{x+8}{\cancel{x-7}} \cdot \frac{3\cancel{(x-7)}}{\underset{2}{6}} = \frac{x+8}{2} //$$

$$8. \quad \frac{y^2 - x^2}{xy} = - \frac{x^2 - y^2}{xy}$$



$$\begin{aligned}
 9. \quad \frac{5z}{xy} - \frac{6x}{yz} &= \frac{5z \cdot z}{xy \cdot z} - \frac{6x \cdot x}{yz \cdot x} \\
 &= \frac{5z^2}{xyz} - \frac{6x^2}{xyz} \\
 &= \frac{5z^2 - 6x^2}{xyz} //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10. \quad \text{ii) } 5x^2 + 13x - 6 &= \frac{(5x)^2 + 13(5x) - 30}{5} = \frac{(5x + 15)(5x - 2)}{5} \\
 &= \frac{5(x+3)(5x-2)}{5} = (x+3)(5x-2)
 \end{aligned}$$


$$\text{iii) } 2x^2 + 5x - 3 = \frac{(2x)^2 + 5(2x) - 6}{2} = \frac{(2x+6)(2x-1)}{2} = \frac{2(x+3)(2x-1)}{2} = (x+3)(2x-1)$$

$$\text{Luego } \frac{5x^2 + 13x - 6}{2x^2 + 5x - 3} = \frac{(x+3)(5x-2)}{(x+3)(2x-1)} = \frac{5x-2}{2x-1} //$$

$$\begin{aligned}
 11. \quad \# \text{ ceros} &= \frac{x^3 + 8}{4 - x^2} = \frac{x^3 + 2^3}{2^2 - x^2} = \frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{(2+x)(2-x)} \\
 &= \frac{x^2 - 2x + 4}{2-x} //
 \end{aligned}$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$




$$12. \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{(x-y)(x+y)} = \frac{x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2}{x^2 - y^2}$$

$$= \frac{4xy}{x^2 - y^2}$$

$$13. \frac{x^2 - 4x + 16}{x^3 + 64} = \frac{x^2 - 4x + 16}{x^3 + 4^3} = \frac{\cancel{(x^2 - 4x + 16)}}{(x+4) \cancel{(x^2 - 4x + 16)}} = \frac{1}{x+4} //$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$14. \frac{1 - \frac{4}{x^2}}{\frac{x+2}{x}} = \frac{\left(1 - \frac{2}{x}\right) \cancel{\left(1 + \frac{2}{x}\right)}}{\cancel{\left(1 + \frac{2}{x}\right)}} = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x} //$$



$$\begin{aligned}
 15. \quad \frac{\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{a}}{\frac{1}{2a}} &= \frac{\frac{a-b-(a+b)}{a}}{\frac{1}{2a}} = \frac{\cancel{a}-b-\cancel{a}-b}{a} \cdot 2\cancel{a} \\
 &= -2b \cdot 2 \\
 &= -4b //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 16. \quad \frac{m^3-t^3}{t^2-m^2} &= \frac{\overset{-1}{(m-t)}(m^2+mt+t^2)}{(t-m)(t+m)} \\
 &= \frac{m^2+mt+t^2}{-(t+m)} \\
 &= \frac{m^2+mt+t^2}{-t-m} //
 \end{aligned}$$


$\frac{m-t}{t-m} = -1$

17. El recíproco de $\frac{a-b}{1-k}$ es $\frac{1-k}{a-b}$

El opuesto de $\frac{1-k}{a-b}$ lo podemos escribir

de tres formas :

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{1-k}{a-b} \\ \frac{k-1}{a-b} \\ \frac{1-k}{b-a} \end{array} \right.$$



$$18. \quad \frac{2a-6}{3a^2b} : \frac{a^2-5a+6}{6ab}$$

$$= \frac{2a-6}{3a^2b} \cdot \frac{6ab}{a^2-5a+6}$$

$$= \frac{2\cancel{(a-3)}}{\cancel{3}a^2\cancel{b}} \cdot \frac{\cancel{6}^2\cancel{a}\cancel{b}}{(\cancel{a-3})(a-2)} = \frac{4}{a(a-2)} = \frac{4}{a^2-2a} //$$


$$19. \quad \frac{x^2-a^2}{x^2-ax} : \frac{x-a}{x+a}$$

$$= \frac{(x+a)\cancel{(x-a)}}{x(x-a)} \cdot \frac{x+a}{\cancel{(x-a)}}$$

$$= \frac{(x+a)^2}{x(x-a)} //$$

$$\frac{a^2}{\frac{a}{2}} = a^2 \cdot \frac{2}{a} = 2a$$

$$20. \quad \frac{a}{a-\frac{a^2}{(a-\frac{a}{2})}} = \frac{a}{a-\left(\frac{a^2}{\left(\frac{a}{2}\right)}\right)} = \frac{a}{a-(2a)} = \frac{a}{-a} = -1 //$$



$$21. \frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3} = \frac{b^3 - a^3}{a^3 b^3} = \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{a^3 b^3}$$

$$\frac{(b-a)[(b^2 - 2ab + a^2) + 3ab]}{a^3 b^3}$$

Como $a = \frac{1}{b}$, entonces $ab = 1$


Como $a - b = 3$, entonces $b - a = -3$

entonces la expresión queda igual a $(-3)[(-3)^2 + 3] =$
 $(-3)(12) = -36$

$$22. \frac{\frac{mb}{nq} - \frac{nq}{mp^3} \cdot p^2}{\frac{(mb)^2 - (nq)^2}{mnp}} = \frac{\frac{mb}{nq} - \frac{nq}{mp}}{\frac{(mb)^2 - (nq)^2}{mnp}} = \frac{\frac{(mb)^2 - (nq)^2}{mnpq}}{\frac{(mb)^2 - (nq)^2}{mnp}} = \frac{1}{q}$$

$$23. \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right)^{-1} \cdot \frac{7}{mn} = \left(\frac{n-m}{mn}\right)^{-1} \cdot \frac{7}{mn} =$$

$$\frac{mn}{n-m} \cdot \frac{7}{mn} = \frac{7}{n-m}$$



$$24. \quad \frac{q^n(1 - q^{4n})}{q^{2n} + 1} = \frac{q^n(1 + q^{2n})(1 - q^{2n})}{q^{2n} + 1}$$


$$= q^n(1 - q^{2n}) = q^n - q^{3n}$$

$$25. \quad \frac{A}{B} = \frac{\frac{m^2 - mn + mn}{m - n}}{\frac{n^2 - mn + mn}{n - m}} = \frac{m^2}{\cancel{m} - n} \cdot \frac{\cancel{n} - m}{n^2} = -\frac{m^2}{n^2}$$

26. (1) **Insuficiente**. Si $q=0$, la expresión es $\frac{(p+0)(p-0)}{(p+0)^2 - 2p \cdot 0} = \frac{p^2}{p^2} = \begin{cases} 1 \\ 0 \\ \text{Indeterminado} \end{cases}$
(Con $p=0$)

(2) **Insuficiente**. Si $p=q=1$, la expresión es: $\frac{(1+1)(1-1)}{(1+1)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{0}{2} = 0$

(1) y (2) **suficientes**, pues se asegura que no es indeterminado y es $\frac{1}{2}$




27. (1) Insuficiente. Si $q=2$
 (2) Insuficiente. Si $q=-3 \longrightarrow \frac{(-3+3)^2}{2} = 0$ (No es positivo)

(1) y (2) Suficientes $(q+3)$ es par $\neq$
 $(q+3)^2$ es par ≥ 4
 luego $\frac{(q+3)^2}{2}$ es par positivo.

28. (1) Insuficiente. Si $n^3 - 1 = 7$ (con $n=2$ y $1=1$)
 $\frac{n^3-1}{n} = \frac{7}{2}$ no es entero.


(2) Suficiente. $\frac{n^3-1}{n} = \frac{n^3}{n} - \frac{1}{n} = n^2 - \frac{1}{n}$
 Entero Entero



29. (1) Suficiente. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{a^2 + b^2}{ab}$, si
 (a y b $\in \mathbb{N}$) $a^2 + b^2$ es múltiplo de ab , entonces
 $\frac{a^2 + b^2}{ab}$ es un número entero positivo (natural)
- (2) Suficiente. Si $a - b = 0 \rightarrow a = b$
 (a y b $\in \mathbb{N}$) luego $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{b}{b} + \frac{b}{b} = 1 + 1 = 2$
 es natural.

30. Con (1) por sí sola se resuelve el problema
 haciendo $a + b = 3$ y reemplazando en

$$\frac{(a+b)^2 - 4(a+b)}{-(a+b)}$$




Solucionario

Ecuación de Primer Grado

$$\begin{aligned}1. \quad 2x - x &= -5 - 1 \\x &= -6 \quad / ()^2 \\x^2 &= 36 \\x^2 + 1 &= 36 + 1 = 37\end{aligned}$$

$$2. \quad \frac{10b}{5b} - \frac{15b^2}{5b} = 2 - 3b$$

$$\begin{aligned}3. \quad -\{3 - [3 - 3x + 2] + 5\} &= 12 - 4x \\-\{3 - [5 - 3x] + 5\} &= 12 - 4x \\-\{3 - 5 + 3x + 5\} &= 12 - 4x \\-3 - 3x &= 12 - 4x \Rightarrow x = 15\end{aligned}$$



$$4. \quad \frac{3x+2}{6} + \frac{2x-3}{2} = \frac{x+5}{5} \quad \text{es} \quad / \cdot 30$$

$$5(3x+2) + 15(2x-3) = 6(x+5)$$

$$15x + 10 + 30x - 45 = 6x + 30$$

$$45x - 6x = 30 + 45 - 10$$

$$39x = 65$$

$$x = \frac{65}{39} : 13$$

$$x = \frac{5}{3}$$

El recíproco de $\frac{5}{3}$ es $\frac{3}{5}$

$$5. \quad \frac{2}{3}x - 3x + \frac{2}{5} = -2x + \frac{31}{15}, \quad \text{el valor del opuesto de } x \text{ es} \quad / \cdot 15$$


$$10x - 45x + 6 = -30x + 31$$

$$10x - 45x + 30x = 31 - 6$$

$$-5x = 25$$

$$x = -5$$

El valor opuesto de x es 5



$$6. \quad 3t + 1 = 10$$

$$3t = 9 \Rightarrow t = 3$$

$$2t + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$7. \quad \left. \begin{array}{l} \text{i)} \quad 2(x^2 + 6x + 9) - 4x = 2x^2 + 4 \\ \quad \quad 2x^2 + 12x + 18 - 4x = 2x^2 + 4 \\ \text{ii)} \quad x^2 - a^2 = x^2 - ax \Rightarrow ax = a^2 \\ \text{iii)} \quad x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = x^3 + 6x^2 + 1 \\ \quad \quad -12x^2 + 12x = 9 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Ec. de 1er grado} \\ \text{Ec. de 1er grado} \\ \text{Ec. de 2º grado} \end{array}$$


$$8. \quad 0,1x + 0,5x - 0,25 = 0,75 \text{ es}$$

$$0,6x = 0,75 + 0,25$$

$$\frac{6}{10}x = 1$$

$$x = \frac{10}{6}$$

$$x = 1.\bar{6}$$



$$9. \quad 75x = 750 \Rightarrow x = 10$$

$$w = 250$$

$$\frac{w}{x} = \frac{250}{10} = 25$$

$$10. \quad 0,1\bar{6}x + 0,25x + 2 = 0,3, \text{ es}$$

$$\frac{1}{6}x + \frac{1}{4}x + 2 = \frac{1}{3} \quad | \cdot 24$$

$$4x + 6x + 48 = 8$$


$$10x = -40$$

$$x = -4$$

El inverso aditivo de -4 es 4

$$11. \quad \frac{2-x}{x-5} = 4 \Rightarrow \frac{x-5}{2-x} = \frac{1}{4} \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{5-x}{2-x} = -\frac{1}{4}$$



12. la ecuación $\frac{4}{5x} - 3 = \frac{2}{x}$ es $\wedge \cdot 5x$

$$4 - 15x = 10$$

$$-15x = 6$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

Inverso multiplicativo de $-\frac{2}{5}$ es $-\frac{5}{2}$


El opuesto de $-\frac{5}{2}$ es $\frac{5}{2}$

13. $-2m = -T - 6n$
 $-2m = -(T + 6n)$

14. Opuesto de -3 es 3 . por lo tanto

$$a + 2 \cdot 3 = 10 \Rightarrow a = 4$$

El inverso aditivo de a es -4



$$15. \quad X = \frac{24 \cdot 10^{-3} \cdot 10^2}{3 \cdot 10^{-2}}$$

$$X = 8 \cdot 10 = 80$$

$$16. \quad \frac{(p-b)}{\cancel{5}^1} = \frac{3(p+b)}{\cancel{20}^4}$$

$$4(p-b) = 3(p+b)$$

$$4p - 4b = 3p + 3b$$

$$4p - 3p = 3b + 4b$$

$$\boxed{p = 7b}$$

$$17. \quad \text{se debe considerar } 2x+3=7 \text{ y } 2x+3=-7$$

$$2x+3=7$$

$$2x=4$$


$$x=2$$

$$2x+3=-7$$

$$2x=-10$$

$$x=-5$$

Conjunto Solución:
 $\{-5, 2\}$



18. se despeja x

$$3ax - 3x = a + 2a$$

$$\cancel{3}x(a-1) = \cancel{3}a$$

$$x(a-1) = a$$

$$x = \frac{a}{a-1} \text{ y } a \neq 1$$

19.

I) Verdadero:

$$3x - 15 + 10 = 2x - 5$$

$$x = 0$$

II) Verdadero:

$$20x + 8 - 18x - 6 = 2x + 2$$

$$0x = 0$$

x puede tener cualquier valor

III) Verdadero

$$7x - 3 + 3x = 10x + 10 - 4$$

$$0x = 9$$

NO existe ningún valor de x que verifique esta condición

20.

- I) $a = b$ NO
- II) $a > b$ ✓
- III) $a \neq b$ ✓

$$\frac{bx}{a} = \frac{ax+b^2}{a} - b \quad / \cdot a$$

$$bx = ax + b^2 - ab$$

$$bx - ax = b^2 - ab$$

$$x(b-a) = b^2 - ab$$

Se analiza para I); II) y III)

I) si $a = b \Rightarrow b - a = 0$

$$\Rightarrow 0 \cdot x = b^2 - ab$$

NO tiene solución!!

II) si $a > b \Rightarrow b - a \neq 0$

Entonces la ecuación tiene solución única

III) si $a \neq b \Rightarrow b - a \neq 0$

Entonces la ecuación tiene solución única



$$21. \quad \frac{1}{2}x - 6g = kx \quad | \cdot 2$$

$$x - 12g = 2kx$$

$$x - 2kx = 12g$$

$$x \cdot (1 - 2k) = 12g$$

$$x = \frac{12g}{1 - 2k} \quad y \quad k \neq \frac{1}{2}$$

$$22. \quad BC - AC = AB$$

$$BC = AB + AC$$

$$BC = A(B + C) \Rightarrow A = \frac{BC}{B + C}$$

$$A^{-1} = \frac{B + C}{BC}$$


$$23. \quad \begin{array}{l} \text{Edad} \\ \text{niño} \end{array} - 12 = 2 \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Edad} \\ \text{niño} \end{array} = 14 \text{ años}$$

Finalmente:

$$\frac{n + 12}{2} = 14 \quad | \cdot 2$$

$$n + 12 = 28$$

$$n = 16$$



24. $21X = 7 \cdot 4200$

$$X = \frac{7 \cdot 4200}{21} \Rightarrow X = \$1.400$$

25. $K - 273 = \frac{5}{9} \cdot (F - 32)$


$$9 \cdot (K - 273) = 5 \cdot (F - 32)$$

$$\frac{9}{5} \cdot (K - 273) = F - 32 ; \text{ Finalmente:}$$

$$F = \frac{9}{5} \cdot (K - 273) + 32$$

26. (1) Si $b = 6$. entonces $x = 6$

(2) Si $x = 6$. entonces $b = 6$




$$27. \quad \frac{a}{100} \cdot X = \frac{b}{100} Y$$

$$X = \frac{bY}{a}$$

Con (1) y con (2) por separado se determina que $X = \frac{bY}{a}$

28. Con las informaciones (1) y (2) no es posible determinar que $2(a-2c) + 3b = 5b$



29. (1) Insuficiente:
Si $x = -1$ se obtienen
dos valores para a
 $-1 + a = 2$ y $-1 + a = -2$

(2) Insuficiente:
No se tiene el
valor de x .

(1) y (2) Suficiente.
de (1) se tiene que
 $a = 3$ ó $a = -1$
y con (2) se descarta
 $a = -1$.
Finalmente $a = 3$

30. $\frac{2x + 2a}{4x} = \frac{1}{2}b$
Se despeja x .

$$\begin{aligned} 2x + 2a &= 2bx \quad / :2 \\ x + a &= bx \\ x - bx &= -a \\ x(1-b) &= -a \\ x &= \frac{-a}{1-b} \end{aligned}$$

$$x = \frac{a}{b-1}$$

Condición a
Verificar

(1) Suficiente:
Si $a, b < 0$ entonces
 $\frac{a}{b-1} > 0$

(2) Suficiente:
Se cumple que
 $x = \frac{a}{b-1}$ y $\frac{a}{b-1} > 0$

